

٥ - امقدمة:

الكحولات والفينولات مركبات عضوية تحتوي على مجموعة هيدروكسيل OH⁻. يأخذ الكحول الصيغة العامة ROH، ويأخذ الفينول الصيغة ArOH، وهذا التركيب مشتق من الماء حيث استبدلت ذرة الهيدروجين إما بمجموعة R أو Ar، وتعبر R عن مجموعة الكيلية وتعبر Ar عن مجموعة أريلية، أي أنه في حالة الكحولات تكون المجموعة الهيدروكسيلية متصلة بذرة كربون مشبعة³ ، بينما تكون تلك المجموعة في الفينولات متصلة مباشرة بذرة كربون غير مشبعة². لذلك فإن خواصها الفيزيائية والكميائية مختلفة، ومن هذا نجد أن مجموعة الهيدروكسيل المرتبطة بحلقة أромاتية لا تدخل مركباتها ضمن مركبات الكحولات. هذا وقد تحتوي المجموعة الألكيلية في الكحولات على رابطة مضاعفة أو ذرة هالوجين أو حلقة أromاتية أومجموعات أخرى. ومن الكحولات ما يتكون من مجموعة هيدروكسيل أو أكثر تقع على ذرات كربون مختلفة.

٦ - تصنيف الكحولات:

تصنف الكحولات عادة إلى ثلاثة أصناف حسب عدد ذرات الكربون أو عدد المجموعات الألكيلية المرتبطة مباشرة بذرة الكربون الحاملة لمجموعة الهيدروكسيل، كما يتضح من التراكيب التالية:





كحول ثالثي	كحول ثانوي	كحول أولي
Tertiary 3°	Secondary 2°	Primary 1°
$\begin{array}{c} \text{R} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{R} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{R} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{R}-\text{C}-\text{OH} \\ \\ \text{H} \end{array}$
ذرة الكربون التي تحمل مجموعة OH ⁻ لا تحتوي على ذرات هيدروجين ولكن تحتوي على ثلاثمجموعات الكيل.	ذرة الكربون التي تحمل مجموعة OH ⁻ لا تحتوي على ذرة هيدروجين.	ذرة الكربون التي تحمل مجموعة OH ⁻ لا تحتوي على ذرتين هيدروجين ومجموعة الكيل R.

٥- تسمية الكحولات:


هناك طريقتان للتسمية وهما ، طريقة التسمية الشائعة وطريقة التسمية النظامية IUPAC. والطريقة الأولى يمكن الأخذ بها في حالة المركبات البسيطة.

١. التسمية بالطريقة الشائعة:


ويتم في هذه التسمية ذكر اسم المجموعة الهيدروكربونية تتبعها كلمة كحول:




Isopropyl alcohol



Tert-Butyl alcohol




Cyclopentyl alcohol




Benzyl alcohol

٢. التسمية النظامية: (حسب قواعد أيوبارك) :

١. يتم اختيار أطول سلسلة كربونية مستمرة تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل -OH كمركب الكانيأساسي وتحذف من اسم هذا الألكان النهائي (e) وتستبدل بالمقطع




Methanol




-oh . مثال :

Ethanol


٢. ترجم السلاسل بحيث تعطى ذرة الكربون الحاملة لمجموعة اليدروكسيل OH- أصف رقم ممكн بغض النظر عن المجموعات البديلة الأخرى، وفي حالة المركبات الحلقية فإن ذرة الكربون الحاملة لمجموعة اليدروكسيل تعطى الرقم (١) بصفة دائمة كما يتضح من الأمثلة التالية:




1-Propanol




Cyclohexanol



2-Pentanol




4-Ethyl-2-hexanol




2-(2-Bromoethyl)-1-Pentanol


٣. إذا وجد في بناء المركب الكحولي روابط ثنائية أو ثلاثة فيجب اختيار السلسلة التي تحتوي على مجموعة الـ هيدروكسيل وتلك الروابط حتى ولو لم تكن المجموعات واقعة على أطول سلسلة. هذا وترقم السلسلة من الطرف الأقرب لمجموعة الـ هيدروكسيل حيث لها الأفضلية على الرابطة الثنائية والرابطة الثلاثية.




4-Methyl-1-Penten-3-ol



3-Ethyl-3-buten-2-ol




3-Butyn-2-ol




4-Methyl-2-cyclohexenol

٤. إذا تعددت مجموعات الهيدروكسيل عندها توضع المقاطع *tri*, *di*, *tetra* قبل المقطع *oh*- للإشارة إلى عدد تلك المجموعات. وبعضها له أسماء شائعة.



تسمية نظامية



1,2,3-Propanetriol

تسمية شائعة

Ethylene glycol


Glycerol or Glycerene

تسمية الفينولات:

تم تسمية مشتقات الفينول بانتسابها لأبسط مركبات تلك العائلة وهو الفينول وتسمى أيضاً بأسماء مختلفة، فمثلاً تعتبر مجموعة *-OH* في بعض الحالات مجموعة بديلة يطلق عليها هيدروكسي، كما في مركب البنزالديهيد وحمض البنزويك، وقد تأخذ أسماء شائعة أخرى كالكريزول كما يتبع من الأمثلة التالية:




Phenol



m-Bromophenol



p-Aminophenol




o-Hydroxybenzoic acid (Salicylic acid)



Hydroquinone

٤- الخواص الفيزيائية للكحولات والفينولات:

ترتبط جزئيات الكحول أو الفينول بعضها ببعض بروابط هيدروجينية، وتتشاءم تلك الرابطة عند وجود ذرة هيدروجين مرتبطة برابطة تساهمية مع ذرة عالية السالبية الكهربية مثل الفلور والأكسجين والنیتروجين. لذلك تميز الكحولات والفينولات بارتفاع درجة غليانها مقارنة بالمواد الأخرى التي تقابلها في الوزن الجزيئي (لها وزن جزيئي مقارب)، والتي تحتوي على روابط هيدروجينية.




روابط هيدروجينية

وفيما يلي مقارنة بين درجات الغليان لمركبين متقاربين في الوزن الجزيئي ولكن يختلفان في التركيب أحدهما الإيثanol والأخر البروبان.

Ethanol	Propane	الوزن الجزيئي
٤٦ جم/مول	٧٨ °م	درجة الغليان
٤٤ جم/مول	٤٢ °م	

وتحتسبط الكحولات والفينولات عمل روابط هيدروجينية مع الماء، مما يفسر ذائبتها العالية فيه ، فالكحولات الصغيرة مثل الكحول الإيثيلي تمتزج مع الماء بشكل تام وبأية نسبة ، وتقل الذائبية كلما زاد الوزن الجزيئي ، أي كلما زاد عدد ذرات الكريون في المركب ، معبقاء عدد مجموعات الهيدروكسيل ثابتاً .




روابط هيدروجينية

٥- تحضير الكحولات والفينولات:


أ. تحضير الكحولات:

تحضير الكحولات في المختبر بشكل عام بإضافة الماء المحمض إلى الألكينات، وتتبع الإضافة قاعدة ماركونيكوف.




أما في الصناعة فسنذكر تحضير الميثanol Methanol والإيثانول Ethanol، ففي حالة الميثanol هناك طريقتان:

أ. من الفحم: يمرر البخار على الفحم الساخن ليتكون غاز الماء water gas (خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين).




ثم يخلط Water gas مع نصف حجمه هيدروجين ثم يمر على خليط من أكسيد الزنك والكروم الثلاثي عند درجة حرارة 300°C تحت ضغط جوى 300 atm.




بـ. من الغاز الطبيعي :Natural gas

في هذه الطريقة يمر الميثان الناتج من الغاز الطبيعي مع البخار على النيكل عند درجة حرارة 900°C تقريباً وتحت ضغط.



خلط الغازات الناتج يسمى Synthesis ويتم تحويله إلى الميثanol حسب الطريقة السابقة.




أما تحضير الإيثanol في الصناعة فهناك طرفيتان:

أ. يمرر الإيثيلين تحت ضغط على حمض كبريتيك مرکز عند درجة

حرارة 80°C لتكوين Ethyl hydrogen sulphate



ثم يخفف الخليط بالماء ويقطر ليعطي محلول مائي للإيثانول.




ب. أما الطريقة الأحدث فهي إماهة الإستيلين بواسطة إمرار خليط

الإيثيلين والبخار فوق حامض صلب كعامل مساعد (مثل Phosphoric acid)

عند درجة حرارة 300°C وضغط 70 atm تقريباً.

ج. تحضير الفينولات:

يتم الحصول على الفينولات في المختبر عن طريق صهر هيدروكسيد الصوديوم مع حمض بنزين السلفونيك ومعالجة الفينوكسيد الناتج بحمض الهيدروكلوريك.




أما تحضير الفينول في الصناعة فهناك طرفيتان:

1) من الكيومين Cumene، يتم أولاً الكلة البنزين بواسطة البروبين Propene، إما

في الحالة السائلة باستخدام كلوريد الألومنيوم AlCl_3 كعامل مساعد أو في


الحالة الغازية.

باستخدام حمض фосфорيك مع مادة صلبة خاملة كعامل مساعد.




Cumene

ثم يمرر الهواء على الكيومين لينتج الـ Hydroperoxide والذى يتحلل بواسطة حمض الكبريتك المخفف والحرارة المنخفضة.



ولهذه الطريقة أهمية كبيرة لأن الأسيتون يتم الحصول عليه مع الفينول .

٢) تحضير الفينول من الكلوروفينزين:




٥ - تفاعلات الكحولات والفينولات:

من أهم تفاعلات الكحولات والفينولات ما يلى:

١- انتزاع الماء من الكحول لاعطاء الالكين والايثر:

فإذا سخن الكحول مع حمض الكبريتيك لدرجة حرارة متوسطة، فإن ذلك يؤدي إلى الحصول على الإيثر، بينما يعطي الكين إذا سخن الكحول لدرجة حرارة عالية.




أما الكحولات الثانوية والثالثية فتعطي الكينات عند تسخيبتها مع الحمض.

التَّكْسِدُ : Oxidation


تأكسد الكحولات الأولية (١°) إلى الألدهيدات باستعمال عوامل مؤكسدة معتدلة، أو إلى الحمض الكربوكسيلي بالعوامل المؤكسدة القوية. أما الكحولات الثانوية فتتأكسد إلى الكيتونات، بينما يصعب أكسدة الكحولات الثالثة:

ثم يمر الهواء على الكيومين لينتج الهيدروبيروكسيد Hydroperoxide والذي يتحلل بواسطة حمض الكبريتيك المخفف والحرارة المنخفضة.



ولهذه الطريقة أهمية كبيرة لأن الأسيتون يتم الحصول عليه مع الفينول.

٢) تحضير الفينول من الكلوروينزين:




٦- تفاعلات الكحولات والفينولات:

من أهم تفاعلات الكحولات والفينولات ما يلي:

١- انتزاع الماء من الكحول لإعطاء الإلكين والإيثر:


فإذا سخن الكحول مع حمض الكبريتيك لدرجة حرارة متوسطة، فإن ذلك يؤدي إلى الحصول على الإيثر، بينما يعطي الكين إذا سخن الكحول لدرجة حرارة عالية.



أما الكحولات الثانوية والثالثية فتعطي الكينات عند تسخينها مع الحمض.


التأكسد: Oxidation

تتأكسد الكحولات الأولية (١°) إلى الألدهيدات باستعمال عوامل مؤكسدة معتدلة، أو إلى الحمض الكربوكسيلي بالعوامل المؤكسدة القوية. أما الكحولات الثانوية فتتأكسد إلى الكيتونات، بينما يصعب أكسدة الكحولات الثالثية:



٢- التفاعل مع الصوديوم:

تفاعل الكحولات والفينولات مع العناصر الفعالة كيميائياً كالصوديوم لإعطاء مركبات تشبه هيدروكسيد الصوديوم تسمى الكوكسيدات أو فينوكسيدات الصوديوم، ويتضاعد غاز الهيدروجين.



٣- تكوين الإسترات:

تفاعل الكحولات والفينولات مع الحموض الكريوكسيلية لاعطاء الإسترات. ويتم التفاعل بوجود حمض H^+ عاملأ حفازاً.

